




خونریزی و سوراخ شدن روده بزرگ در حین کولونوسکوپی هرچند از عوارض غیر معمول است اما به ندرت ممکن است اتفاق بیوفتد.

برداشتن پولیپ ها و بیوپسی:

پزشک در صورت مشاهده بافت غیر طبیعی و پولیپ در روده بزرگ ، ابتدا از نمونه گرفته جهت بررسی به آزمایشگاه ارسال می شود.

پولیپ در بزرگسالان شایع است اما اغلب بدون خطر است . با این حال گاهی سرطان روده بزرگ از یک پولیپ شروع می شود. بنابراین برداشتن آنها در جلوگیری از سرطان روده بزرگ موثر است .

اگر در حین برداشتن پولیپ و یا بیوپسی خونریزی اتفاق بیافتد، پزشک با داروهای مخصوص، از طریق کولونوسکوپ به آن ناحیه تزریق نموده تا جلوی خونریزی حاصله را بند آورد.



© CAMER FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED.

لیتری به داخل مقعد انجام می شود. مصرف مایعات فراوان جهت تخلیه کامل روده الزامی است.

بیماران باید با پزشک درباره مصرف داروهای نظیر آسپرین-پلاویکس و داروهای ضد دیابتی مشورت کنند.

از آنجایی که جهت انجام کولونوسکوپی از داروهای آرامبخش استفاده می شود. بهتر است بیمار تا ۸ ساعت بعد از انجام کولونوسکوپی، از رانندگی کردن اجتناب نماید.

کولونوسکوپی چگونه انجام می شود؟

در طول مدت انجام کولونوسکوپی بیمار روی تخت به پهلو چپ دراز می کشد. اغلب، داروی آرامبخش ملایمی طبق دستور به بیمار تزریق می شود تا در طول مدت انجام این روش، آرام باشد و دردی احساس نکند.

پزشک لوله باریک و قابل انعطاف و بلندی که سر آن دوربین تعبیه شده و آغشته به ژل روان کننده است که کولونوسکوپ نام دارد را به آرامی از مقعد وارد راست روده میکند. این لوله برای کمک به دید بهتر پزشک، روده بزرگ را با گاز دی اکسید کربن باد می کند. دوربین سر لوله، تصاویر روده بزرگ را بر روی صفحه نمایش منتقل می کند و پزشک به دقت به بررسی روده می پردازد.

کولونوسکوپی روشی است که جهت مشاهده روده بزرگ و راست روده برای تشخیص بافت ملتهب ، زخم و رشد غیر طبیعی بافت روده و پولیپ استفاده میشود. هنگامی صورت میگیرد که بیمار با مشکلاتی در اجابت مزاج، درد شکم، خونریزی از مقعد و یا کاهش وزن به پزشک مراجعه می کند.


چگونه برای کولونوسکوپی آماده شویم؟

پیروی از رژیم غذایی مایع از یک تا سه روز قبل از انجام کولونوسکوپی جهت خالی شدن سیستم گوارش الزامی است. بیماران باید از نوشیدن مایعات حاوی رنگ قرمز یا بنفش و لبنیات خودداری کنند.

مایعات مجاز عبارتند از: آب مرغ یا آب گوشت - آب سوپ - بدون چربی - آب میوه طبیعی - آب - چای - شربت. در صورت احساس ضعف در بیماران غیر دیابتیک مصرف دو قاشق عسل بلامانع می باشد. یکروز قبل از کولونوسکوپی، استفاده از مسهل - تنقیه و شیاف لازم است. مسهل ها معمولاً به شکل قرص ، شربت و یا پودر (که باید در آب حل شوند) می باشند. گاهی تنقیه به دستور پزشک با وارد کردن آب یا سرم نرمال سالین نیم یا یک

بیمارستان بین المللی قائم (عج)

کولونوسکوپی



تهیه و تنظیم: بخش آندوسکوپی


پزشک تایید کننده: دکتر فرشاد اسدی

تحت نظر کمیته آموزشی و سوپروایزر

آموزشی بیمارستان بین المللی قائم (عج)



سلامت شما، تخصص ماست



Ghaem Int Hospital

رشت، بلوار شهید افتخاری

۰۱۳۳۳۵۶۵۰۱۱-۱۹

۰۱۳۳۳۵۶۵۰۱۰

www.ghaem-hospital.ir

info@ghaem-hospital.ir



پزشک خود اطلاع دهند: درد زیاد شکم - خونریزی
- سرگیجه - ضعف - تب

کولونوسکوپی برای چه کسانی لازم است؟

- افراد بالای ۵۰ سال
- افرادی که دچار اسهال یا یبوست بیش از یک هفته شوند.
- افرادی که در خانواده شان سابقه بیماری های التهابی روده یا سرطان روده دارند.
- افرادی که متوجه وجود خون در مدفوع می شوند.
- افرادی که سابقه پولیپ روده دارند.

مراقبت های بعد از کولونوسکوپی

- نیم ساعت بعد از انجام کولونوسکوپی می تواند ابتدا مایعات و سپس رژیم غذایی نرم میل کنید
- از خوردن غذاهای پر حجم و سنگین خودداری نمایید .
- رژیم غذایی نرم تا ۲۴ ساعت رعایت گردد
- از بلند کردن اجسام سنگین تا ۴۸ ساعت اجتناب شود از توالیت فرنگی استفاده شود. و از زور زدن خودداری شود.